

NORME DI PREPARAZIONE VALIDE PER TUTTE LE STRUTTURE DEL GRUPPO HUMANITAS

NORME DI PREPARAZIONE PROCEDURA DI SCLEROEMBOLIZZAZIONE VARICOCELE

La procedura viene eseguita su indicazione clinica dello specialista urologo e previa valutazione congiunta dello specialista radiologo, in seguito ad una visita specialistica ambulatoriale urologica.

Tutti i pazienti, nei sei mesi antecedenti la procedura di scleroembolizzazione di varicocele, devono aver eseguito un ecocolordoppler testicolare e scrotale.

La procedura viene eseguita in anestesia locale, senza ricorso a sedazione o a altri farmaci ipnotici.

Durata della procedura: la procedura durerà circa un'ora e il paziente dovrà poi trattenersi almeno tre ore in osservazione.

Il giorno fissato per l'esame, il paziente

- dovrà essere accompagnato;
- portare con sé gli esami del sangue non anteriori ai 30 giorni di **PT/PTT/Emocromo con formula** e non anteriori ai 90 giorni di **Creatininemia**;
- se assume terapie anticoagulanti/antiaggreganti (ad esempio Coumadin, Sintrom, Plavix, Aspirina) dovrà confrontarsi con il proprio medico curante per sospenderli nei giorni precedenti all'esame;
- dovrà essere a digiuno da almeno 6 ore;
- **esibire l'eco color doppler testicolare e scrotale ed altra documentazione clinica** (visite specialistiche, descrizione di interventi chirurgici, lettere di dimissione ospedaliera, ...) **e radiologica** (radiografie, ecografie, tomografie computerizzate o Risonanza Magnetica) relative alla problematica in esame;
- portare con sé la tessera sanitaria.

Il paziente dovrà tornare per un controllo ambulatoriale con visita Urologica a 4 mesi dall'intervento

L'eventuale esecuzione di ulteriori esami radiologici di follow-up verrà stabilita dal Medico Radiologo Interventista.

Dopo la procedura si raccomanda l'astensione da attività sportive, di carico per 20 giorni e dell'attività sessuale per 10 giorni.