

NORME DI PREPARAZIONE VALIDE PER TUTTE LE STRUTTURE DEL GRUPPO HUMANITAS

tranne per Humanitas San Pio X consultare la preparazione presente a pag. 4-5

tranne per Humanitas Gavazzeni e Humanitas Castelli consultare la preparazione presente a pag. 8

Dipartimento di Diagnostica per Immagini

- 1. TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA CON MEZZO DI CONTRASTO (TAC)**
- 2. FLEBOGRAFIA**

Il paziente è invitato ad attenersi scrupolosamente alle norme riportate.

Il giorno dell'esame TAC presentarsi a **digiuno da almeno 8 ore** e **portare** in visione i **risultati** dei seguenti esami, **eseguiti da non più di un mese**:

- Glicemia
- AST
- ALT
- IGM
- Rapporto Kappa/Lambda (in alternativa elettroforesi delle proteine)
- Creatinina

Portare con sé gli esami radiologici precedenti.

Il giorno dell'esame è necessario portare con sé la **prescrizione medica** (rossa, dematerializzata o su carta intestata) e **una fotocopia** della stessa da presentare al personale sanitario. La prescrizione medica deve riportare l'esame richiesto e il quesito diagnostico.

NORME DI PREPARAZIONE VALIDE PER TUTTE LE STRUTTURE DEL GRUPPO HUMANITAS

tranne per Humanitas Gavazzeni e Humanitas Castelli consultare la preparazione presente a pag.9

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO PER ALLERGIA A MEZZO DI CONTRASTO

In relazione alla Sua anamnesi positiva per reazione avversa a MdC, **Le suggeriamo di sottoporsi al seguente** schema di premedicazione da condividere con il Suo Medico di Medicina Generale*:

- 1) Prednisone 50 mg/os (Deltacortene forte 25 mg 2cp)**
13 ore prima, 7 ore prima e 1 ora prima dell'esecuzione dell'esame;
- 2) Omeprazolo 20mg (Omeprazolo 20 mg 1 cp)**
Da assumere 10 minuti prima della terapia cortisonica (13 ore prima, 7 ore prima, e un'ora prima dell'esame);
- 3) Antistaminico [Es. Cetirizina (Zirtec 1cp) OPPURE Desclorfeniramina (Polaramin 1 cp)]**
1 ora prima dell'esecuzione dell'esame.

*Linee Guida SIRM-SIAAIC

NORME DI PREPARAZIONE VALIDE PER TUTTE LE STRUTTURE DEL GRUPPO HUMANITAS

tranne per Humanitas Gavazzeni e Humanitas Castelli consultare la preparazione presente a pag.9

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO PER ALLERGIA A MEZZO DI CONTRASTO

In pazienti con angioedema ricorrente, mastocitosi o anafilassi idiopatica

In relazione alla Sua anamnesi, Le suggeriamo di sottoporsi al seguente schema di premedicazione da condividere con il Suo Medico di Medicina Generale*:

- 1) Prednisone 50 mg/os (Deltacortene forte 25 mg 2cp)**
12 ore prima e 2 ore prima dell'esecuzione dell'esame;
- 2) Omeprazolo 20mg (Omeprazolo 20 mg 1 cp)**
Da assumere 10 minuti prima della terapia cortisonica (12 ore prima e 2 ore prima dell'esecuzione dell'esame);
- 3) Antistaminico [Es. Cetirizina (Zirtec 1cp) OPPURE Desclorfeniramina (Polaramin 1 cp)] 1 ora prima dell'esecuzione dell'esame;**
- 4) Montelukast (Montegen 10mg 1 cp OPPURE Singulair 10mg 1 cp)**
Ogni sera a partire da 10 giorni prima dell'esecuzione dell'esame.

*Linee guida SIRM-SIAAIC

NORME DI PREPARAZIONE VALIDE PER HUMANITAS SAN PIO X - MILANO

Dipartimento di Diagnostica per Immagini

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA CON MEZZO DI CONTRASTO (TAC)

Il giorno fissato per l'esame presentarsi con:

- Gli esiti dei seguenti esami del sangue: **Creatininemia** e **Azotemia** non anteriore ai 60 giorni
- Digiuno non inferiore alle 6 (sei) ore.
- **Documentazione clinica** (visite specialistiche, descrizione di interventi chirurgici, lettere di dimissione ospedaliera, ...) e **Radiologica** (radiografie, ecografie, tomografie computerizzate o Risonanza Magnetica) relative alla problematica in esame.
- **Tessera sanitaria.**
- **Richiesta del Medico** (*con quesito clinico*)

ATTENZIONE

In caso di **terapia medica** o **farmaci salvavita** la terapia **non deve essere sospesa**

Se è in trattamento con **metformina**.

- Il **farmaco** deve essere **sospeso due giorni** prima dell'esame e **due giorni** dopo l'esame.
- ✦ Se ha avuto precedenti **reazioni a mezzo di contrasto iodato** o a **farmaci** (eritema generalizzato, orticaria/angioedema, broncospasmo, ipotensione, anafilassi, reazioni cutanee ritardate):
 - eseguire **visita allergologica** prima di sottoporsi all'esame
- ✦ Se è affetto da stabilizzazione del quadro clinico. **Asma bronchiale sintomatico, orticaria in atto** è preferibile rinviare l'esame fino a stabilizzazione del quadro clinico.
- ✦ Se è affetto da Angioedema ricorrente, Mastocitosi, Anafilassi Idiopatica
 - dovrà recarsi dal suo Medico di Medicina Generale per farsi prescrivere:
 - ✚ **Prednisone 50 mg** (1 cp 12 e 2 ore prima dell'esame)
 - ✚ **Cetirizina 10 mg + Montelukast 10 mg** (1 cp 1 ora prima dell'esame)
- ✦ Se ha una **funzionalità renale ridotta** (Creatinina alta – *al di fuori del range di riferimento del*

HUMANITAS

Laboratorio presso cui è stato eseguito l'esame):

➤ dovrà recarsi dal suo Medico di Medicina Generale per farsi prescrivere:

✚ **Acetilcisteina** (esempio: Flumucil, 2 cps da 600 mg x 2/die il giorno prima ed il giorno dell'esame)

✚ **richiesta** per l'esecuzione della **Creatininemia** da eseguire il giorno stesso dell'esame.

- **Sospendere** la terapia diuretica **il giorno prima** dell'esame **e il giorno stesso dell'esame**.
- **Il giorno dell'esame** dovrà presentarsi **in Radiologia 1 ora prima dell'esame per completare la preparazione**.

In caso di terapia medica o farmaci salvavita la terapia non deve essere sospesa

ATTENZIONE

Si prega cortesemente di segnalare appena possibile eventuali impedimenti che rendessero impossibile l'esecuzione telefonando al numero 02 6951 7801

NORME DI PREPARAZIONE VALIDE PER

TUTTE LE STRUTTURE DEL GRUPPO HUMANITAS

tranne per Humanitas Gavazzeni e Humanitas Castelli consultare la preparazione presente a pagina 8

Dipartimento di Diagnostica per Immagini

UROTAC

Informativa per il medico di medicina generale

Oggetto: esecuzione Urotac

Gentile Collega,

Con la presente desideriamo informarti sulle modalità prescrittive in regime di Servizio Sanitario Nazionale dell'esame di cui in oggetto.

La **Urotac**, consente di ricostruire le vie urinarie al termine della tac dell'addome con contrasto, avendone una valutazione simil-urografica. L'esame consente una valutazione sia del parenchima renale che delle vie escrettrici unendo i vantaggi diagnostici della TC (panoramicità) con i rilievi propri della urografia.

L'indagine ha quindi valenza sia morfologica che funzionale.

Le principali indicazioni possono essere costituite dalla ematuria e dallo studio della patologia litiasica e neoplastica (in particolare vescicale).

La modalità prescrittiva prevede che sulla stessa impegnativa siano riportate le tre prestazioni seguenti:

88.01.6	TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ADDOME COMPLETO, SENZA E CON CONTRASTO +
8819	RADIOGRAFIA (RX) DELL'ADDOME

Dipartimento di Diagnostica per Immagini

Informativa per il paziente

Portare con sé l'esito dei seguenti esami del sangue:

- AST - ALT
- glicemia
- creatinina
- IgM
- rapporto kappa/lambda (o, in alternativa, elettroforesi delle proteine)

È consentita l'assunzione di farmaci nelle terapie croniche.

Presentarsi a **digiuno da almeno 8 ore** dall'orario di esecuzione dell'esame.

Portare con sé gli esami radiologici precedenti.

Il giorno dell'esame è necessario portare con sé la **prescrizione medica** (rossa, dematerializzata o su carta intestata) **e una fotocopia** della stessa da presentare al personale sanitario. La prescrizione medica deve riportare l'esame richiesto e il quesito diagnostico.

NORME DI PREPARAZIONE VALIDE PER HUMANITAS GAVAZZENI E CASTELLI (BERGAMO)

Dipartimento di Diagnostica per Immagini

PREPREPARAZIONE PER

- **TC CON E SENZA MEZZO DI CONTRASTO**
- **TAC TORACE PER STUDIO CIRCOLO CORONARICO**
- **ANGIO TAC**
- **URO TAC**

- Digiuno da 6 ore.
- Il paziente deve presentarsi il giorno dell'esame con gli esiti recenti (massimo 30 giorni precedenti la data di esecuzione dell'esame) di CREATININEMIA e GLICEMIA
- È necessario portare con sé il modulo di idoneità al mezzo di contrasto rilasciato e compilato dal medico di base.
- Non interrompere le terapie farmacologiche abituali.

Documentazione necessaria:

- Tessera sanitaria valida.
- Impegnativa del medico curante.
- Certificati di esenzione dal pagamento del ticket sanitario.
- Eventuali esami e visite precedenti inerenti.

In caso di rinuncia si prega di avvisare tempestivamente chiamando il numero telefonico 0354204004
(segreteria telefonica sempre attiva)

NORME DI PREPARAZIONE VALIDE PER HUMANITAS GAVAZZENI E CASTELLI (BERGAMO)

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO PER PAZIENTI A RISCHIO DI REAZIONE ALLERGICA A MEZZI DI CONTRASTO (MDC)

In caso di pazienti a rischio di reazione allergica a MDC (precedente reazione allergica a MDC a base di Iodio o Gadolinio; asma bronchiale grave in atto, orticaria-angioedema non controllati da terapia; mastocitosi; pregressa anafilassi idiopatica), e nella impossibilità di utilizzo di tecnica diagnostica della medesima efficacia o che utilizzi MDC di classe differente, è consigliato il seguente schema di premedicazione:

A. 13 ore e 7 ore PRIMA della procedura:

- Prednisone 50 mg = 2 compresse da 25mg (es: Deltacortene® o equivalenti) oppure metilprednisolone 32 mg = 2 compresse da 16mg (es: Medrol® o equivalenti)

B. 1 ora PRIMA della procedura:

- Prednisone 50 mg = 2 compresse da 25mg (es: Deltacortene® o equivalenti) o metilprednisolone 32 mg = 2 compresse da 16mg (es: Medrol® o equivalenti)
- Cetirizina 10 mg (Zirtec® o equivalenti, 1 cpr)

Nel caso di **esame in urgenza** si può prendere in considerazione una premedicazione rapida con bolo endovenoso di Idrocortisone 200 mg (Flebocortid®) + Clorfenamina 10 mg (Trimeton®)

NB: Le indicazioni sono basate su documento congiunto SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica) e SIAAIC Società Italiana di Allergologia, Asma ed Immunologia Clinica) del 2018. Le indicazioni fornite sugli schemi di premedicazione devono considerarsi comunque empiriche, non sostenute da solida evidenza scientifica. Il personale medico, infermieristico e tecnico impegnato in procedure diagnostiche che utilizzano i mezzi di contrasto possiede competenze specifiche nella diagnosi e trattamento delle reazioni anafilattiche. In caso di pregressa reazione allergica grave è sempre opportuno allertare preventivamente il medico anestesista/rianimatore

