

Unità Operativa di Urologia

Responsabile: Dott. Paolo Casale

NORME DI PREPARAZIONE BIOPSIA PROSTATICA TRANS-RETTALE DI FUSIONE E/O SISTEMATICHE AMBULATORIALI

IL PAZIENTE È INVITATO AD ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE NORME RIPORTATE

Il paziente dovrà essere accompagnato.

Portare con sé gli esami radiologici precedenti, gli esami specialistici (PSA, Ecografia, ecc.) e la richiesta medica in cui sono specificate le indicazioni dell'esame.

Il paziente in trattamento anticoagulante o antiaggregante (Aspirina, Coumadin, ecc.) dovrà sospendere o modificare la terapia secondo le indicazioni del Centro di riferimento e/o del proprio MMG, che ha prescritto la terapia stessa.

Si ricorda che per i pazienti visti in regime LP o extra regione dovranno portare le impegnative per:

“BIOPSIA PROSTATICA TRANS-RETTALE ECOGUIDATA”

+

“ESAME ISTOLOGICO”

IL GIORNO PRIMA DELL'ESAME

Eeguire un clistere di pulizia con Clisma Fleet alla sera prima di coricarsi (se biopsia prevista al mattino) o al mattino dell'esame (se convocazione prevista dopo le 11-12).

IL GIORNO DELL'ESAME

- Portare con sé l'esito dell'esame per la determinazione del PSA e della **RMN PROSTATICA MULTIPARAMETRICA** (se richiesto dal medico e/o non precedentemente consegnata al medico).

- **Munirsi di 1,5 L di acqua**

- Si consiglia di **fare una colazione leggera** (non è necessario il digiuno).

- Il paziente in trattamento anticoagulante o antiaggregante dovrà portare con sé l'esito dell'esame per la determinazione del PT e PTT o altro richiesto dal centro prescrittore della terapia.

- Assumere 1 bustina di ANTIBIOTICO: FOSFOMICINA 3g sciolta in un bicchier d'acqua un'ora prima della procedura.

- Dopo la procedura è previsto un periodo di osservazione di 90-120 minuti in attesa della prima minzione.

IL GIORNO SUCCESSIVO ALL'ESAME:

- Assumere 1 bustina di FOSFOMICINA 3g sciolta in un bicchier d'acqua a 24h circa dall'esecuzione della biopsia

Eventuali allergie al farmaco dovranno essere segnalate allo specialista al momento della prenotazione dell'esame.

QUALORA IL PAZIENTE NON ABBA ESEGUITO LE INDICAZIONI SOPRA RIPORTATE DOVRÀ ESSERE NECESSARIAMENTE RIPROGRAMMATO.